



# ANTIBOTRYTIS Max

.....  
 Coadiuvanti per la vinificazione di uve affette da *Botrytis* o da marciume acido  
 .....



## → DESCRIZIONE TECNICA

Nelle annate eccessivamente umide l'uva è spesso soggetta ad attacchi di muffa grigia, che si sviluppa sulla superficie degli acini, li perfora e crea le condizioni ideali per lo sviluppo del marciume acido, dovuto all'infestazione di lieviti e batteri, portati dalle drosofile, i moscerini della frutta. In alcune annate il solo rigonfiamento dell'acino conseguente a giornate piovose, è sufficiente per lacerare la buccia e far fuoriuscire del mosto, i cui zuccheri favoriscono un rapido sviluppo della microflora infestante.

I mosti ottenuti da queste uve sono fortemente compromessi dal punto di vista microbiologico: sono infatti presenti elevate concentrazioni di lieviti apiculati (*Hanseniaspora*, *Metschnikowia*, *Kloeckera*), batteri acetici (*Acetobacter*, *Gluconobacter*) e batteri lattici (soprattutto *Lactobacillus*).

Anche dal punto di vista chimico i danni derivati dallo sviluppo della *Botrytis* e del marciume sono considerevoli, in quanto si riscontrano elevate concentrazioni di acido gluconico e di acido acetico. Si ha inoltre una diminuzione delle concentrazioni zuccherine e del peso dei grappoli.

I problemi enologici più rilevanti sono dovuti alla presenza della laccasi, un enzima ossidante prodotto dalla *Botrytis cinerea*, costituito da una parte proteica e da un atomo di rame che è indispensabile per la sua funzionalità. La laccasi è una polifenolossidasi aspecifica, che ossida i polifenoli dei vini e comporta, come conseguenze indirette, la produzione di acetaldeide, la riduzione della percentuale di solforosa libera, l'incremento delle note di "svanito", la perdita degli aromi primari, l'imbrunimento dei vini bianchi e l'incremento delle note aranciate nei vini rossi.

La laccasi è un enzima molto stabile, che non viene inattivato dall'alcol, e i suoi effetti dannosi, se non inibiti, permangono anche nei vini finiti. Per limitare gli effetti della laccasi prodotta dalla *Botrytis cinerea* è indispensabile intervenire rapidamente, evitando per quanto possibile l'azione dell'ossigeno presente nell'aria, limitando al massimo il contatto del mosto o del vino con le bucce alterate, accelerando i tempi di macerazione e illimpidimento.

In aggiunta a questi accorgimenti tecnologici, AEB propone specifici coadiuvanti che si adattano in modo ottimale alle diverse tecnologie di vinificazione. In fermentazione su mosti bianchi e rosati parzialmente ossidati. **Antibotrytis Max** è un preparato a base di PVPP, bentonite e lieviti inattivati. Rimuove molto efficacemente i composti ossidati.

## → COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Bentonite attivata, PVPP, scorze di lieviti, autolisati di lieviti, lieviti inattivati.

## → DOSI D'IMPIEGO

Da 30 a 100 g/hL di mosto o per quintale d'uva in funzione dell'attacco botritico.

## → MODALITÀ D'USO

Disperdere in 10 parti di acqua ed aggiungere direttamente al mosto.

## → CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e calore diretti.  
 Sacchi da kg 5 netti.

