MAJORBENTON® Agri

Bentonite indicata per proteggere la superficie delle piante da attacchi di insetti ed organismi trofici

DESCRIZIONE TECNICA

La selezione attenta di montmorillonite (argille di origine vulcanica), costituente fondamentale della bentonite, ed il particolare trattamento termico ed attivazione a cui viene sottoposta ha permesso di ottenere un prodotto ad elevata igroscopia. La particolare conformazione e struttura molecolare della **Majobenton Agri** consente di adsorbire l'acqua così da sottrarla agli organismi parassitari ed infestanti delle piante (insetti, funghi etc.). Legando l'acqua si svolge una vera azione "disidratante" a discapito delle ife fungine, formando un "gel impermeabile" che contrasta l'attacco di crittogame e lo spostamento dei fitofagi, oltre a creare un ambiente sfavorevole per la leggera reazione alcalina che si sviluppa.

Tale barriera esplica inoltre altre funzioni fisiche e biologiche, quali:
1. Effetto cicatrizzante;
2. Potenziatore delle difese naturali;
3. Apporto di micronutrienti naturali;
4. Supporto per le miscele antiparassitarie.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Bentonite attivata.

DOSAGGIO

I dosaggi per ettaro variano dagli 8-10 kg/ha nel periodo invernale, ai 4-6 kg/ha nel periodo estivo. Tutti i trattamenti vanno effettuati nelle ore più fresche della giornata.
Risultano fondamentali nelle zone climatiche ed ambienti protetti (es. serre, tunnel) con alto tasso di umidità.

MODALITÀ D'USO

L'applicazione del prodotto viene effettuata con gli usuali impolveratori e/o atomizzatori agricoli.

Reference: MAJORBENTON_AGRI_TDS_EN_1290825_FOOD_ENO_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com

MAJORBENTON® Agri

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Majobenton Agri è compatibile con i comuni fitofarmaci, ossi-cloruro di rame, silicato di sodio e polvere di roccia.
Viene impiegato nei trattamenti preventivi, tal quale in dosi da 25-30 kg/ha, diluito in dosaggi di 700 g/100 litri di acqua e in miscela con antiparassitari nei diversi stadi vegetativi (es. prefioritura, gemmazione, allegagione, frutto sviluppato etc.) su buona parte di colture frutticole ed orticole a dosaggi variabili dai 300 + 1000 grammi /100 litri di acqua su frutta e dai 200 + 500 grammi /100 litri di acqua sugli ortaggi.

CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e calore diretti

Sacchi da kg 25 netti.

Reference: MAJORBENTON_AGRI_TDS_EN_1290825_FOOD_ENO_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com