



LyseE+

Inaktív élesztő hozzáadott enzimmel



→ LEÍRÁS

A seprőn érlelés (sur lie) nagyon általános gyakorlat, mind a fehér-, mind a vörösborok esetében. Ez a művelet az egyik kulcsa a borokat kiemelésének és komplexitásuk fokozásának. Az élesztő autolízisének optimalizálása nagyszerű ízhatást biztosít.

LyseE+ az új termék, amely inaktivált élesztő- és glükánáz enzimekből [exo (1,3) és (1,6) β -D-glükánáz] áll. Lágyságot, volumet és testességet ad a bornak, valamint segít a szín stabilizálásában. A finomítás végén a természetes sejtfalaknak köszönhetően elősegíti a derítést.

Továbbá a **LyseE+** termékben jelen lévő inaktív élesztő specifikitása elősegíti olyan termékek képződését, amelyek segítik az íz komplexitásának javítását azáltal, hogy hozzájárulnak intracelluláris komponenseik, például aminosavak, peptidek és poliszacharidok felszabadulásához az élesztők által.

Összetevőinek köszönhetően **LyseE+**, a seprőn érlelés során lehetővé teszi a borok eltarthatóságának meghosszabbítását és a fajtajellemzők, különösen az illékonyabbak megőrzését.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Hozzáadás után a LyseE+ kevés keverést igényel, mielőtt a lízis elindul, és minden jótékony vegyületét a táptalajba bocsátja.

Inaktivált élesztőből és glükánáz enzimekből [exo (1,3) és (1,6) β -D-glükánáz] álló termék.

LyseE+ a kezelés végén bársonyos, harmonikus és testes ízt kölcsönöz a bornak. Növeli a borok aromájának intenzitását és tartósságát, és hosszú távon fenntartja azt. Megőrzi a színt, elkerüli a nem ideális seprővel való hosszan tartó érintkezéssel járó kockázatokat, és akár 50%-kal csökkenti a fehérje stabilizáláshoz szükséges bentonit adagját.





LYSEE+

→ ADAGOLÁS

Ajánlott adag: 10 - 30 g/hl.


→ ALKALMAZÁS

Adja hozzá az alkoholos erjedés elején, és hagyja hatni.


A legjobb eredmények a korai hozzáadással érhetők el.

Finomításhoz használva, adja hozzá az alkoholos erjedés háromnegyedénél és hagyja hatni. Ebben az esetben az ajánlott érintkezési idő 1 és 9 hónap között változik, a kívánt mennyiségtől függően.

Esetleges óvintézkedések: ne keverje, ha kevesebb, mint 15 nap van hátra a membránszűrési fázisig.



1. kép: Összehasonlítás az inaktivált élesztő önmagában történő használata és a LyseE+-szal kombinált alkalmazás között.



2. kép: Poliszacharidok felszabadulása.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös, száraz helyen, közvetlen fénytől és hőtől védve.

Nettó 1 kg-os csomagok 5 kg-os kartonokban.

